

| Idade | Vacina Aplicada | Doença Protegida | Reações Possíveis |
|---|---|--|--|
| Ao nascimento (usualmente aplicadas na maternidade) | BCG, Hepatite B | Tuberculose, Hepatite B | Após 1-2 meses, a BCG pode causar uma ferida no local da aplicação. |
| 2 meses | DPT acelular, Hemófilus, Poliomielite, Hepatite B (Hexavalente); Pneumocócica 20 valente; Rotavírus Pentavalente | Difteria, coqueluche, tétano, poliomielite, meningites por hemófilus, hepatite B; meningites, otites, pneumonias; diarreia por rotavírus | 20% das crianças apresentam reação à vacina DPT acelular, com incômodo, choro, febre, irritabilidade e inchaço no local da aplicação. A Pneumo pode causar reação febril em 5% das crianças. |
| 3 meses | Meningite ACWY, Meningite B | Meningites causadas por bactérias meningocócicas A, C, W-135, Y; meningite meningocócica tipo B | Febre, choro, incômodo e dor local em 30% das crianças. |
| 4 meses | DPT acelular, Hemófilus, Poliomielite (Pentavalente); Pneumocócica 20 valente; Rotavírus Pentavalente | Reforços | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 5 meses | Meningite ACWY, Meningite B | Reforços | Febre e dor local em 30% das crianças. |
| 6 meses | DPT acelular, Hemófilus, Poliomielite, Hepatite B (Hexavalente); Pneumocócica 20 valente; Rotavírus Pentavalente; Influenza quadrivalente | Difteria, coqueluche, tétano, poliomielite, hepatite B; meningites, otites, pneumonias; gripes por Influenza | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 7 meses | Influenza quadrivalente | Reforços | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 10 meses | Febre Amarela | Febre amarela | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 1 ano | Varicela + Tríplice Viral (MMR); Hepatite A | Catapora, sarampo, caxumba, rubéola; hepatite A | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 1 ano e 2 meses | Meningite ACWY, Meningite B | Reforços | Febre e dor local em 30% das crianças. |
| 1 ano e 4 meses | DPT acelular, Hemófilus, Poliomielite (Pentavalente); Pneumocócica 20 valente | Reforços | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 1 ano e 8 meses | Varicela + Tríplice Viral (MMR); Hepatite A | Reforços | Raramente ocorrem. |
| Anual | Influenza quadrivalente | Reforços | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 4 anos | Dengue quadrivalente (Qdenga) | Dengue (tipos 1, 2, 3, 4) | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 4 anos e 3 meses | Dengue quadrivalente (Qdenga) | Reforços | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 5 anos | DPT acelular + Poliomielite; Febre Amarela | Reforços | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 6 anos e 2 meses | Meningite ACWY | Reforços | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 10 anos | DPT acelular | Difteria, coqueluche, tétano | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 11 anos e 2 meses | Meningite ACWY | Reforços | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 12 anos | Papilomavírus Humano (HPV nonavalente) | Doenças causadas pelo HPV (tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |
| 12 anos e 6 meses | Papilomavírus Humano (HPV nonavalente) | Reforços | Pode causar febre ou dor no local da aplicação em 10% das crianças. |